

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2020

KỸ THUẬT TRỒNG NGÔ LAI ĐƠN SSC131 NEW**ĐẶC TÍNH**

Giống ngô SSC131 NEW thuộc nhóm giống trung ngày, cây con sinh trưởng mạnh, thân lá to. Trái đồng đều, hạt đóng múp đầu. Hạt to, sây cay, tỷ lệ hạt/trái 80-81%, màu vàng cam, dạng hạt nửa đá. Khả năng chống chịu khá tốt với các loại bệnh cháy lá gỉ sắt. Thời gian sinh trưởng 90-100 ngày. Cho năng suất cao 8-9 tấn/ha.

THỜI VỤ

Tính thích nghi rộng, trồng được 3 vụ trong năm và trên nhiều loại đất khác nhau. Tùy điều kiện sinh thái mà bố trí thời vụ sao cho giai đoạn trổ cờ phun râu nhiệt độ ($15^{\circ}\text{C} < T < 35^{\circ}\text{C}$) để bắp đậu hạt tốt. Cụ thể thời điểm nhạy cảm là miền Nam tháng 2, 3; miền Bắc cuối tháng 12 đến đầu tháng 1 dương lịch.

MẬT ĐỘ

SSC131 NEW không thích hợp trồng dày, mật độ thích hợp cho năng suất cao nhất là 67.000 cây/ha, tương đương với khoảng cách là 75x20 cm hoặc 65x25 cm. Lượng giống cần cho 1 ha 14-16 kg.

PHÂN BÓN

Phân nguyên chất (kg): 150-180 N + 80-100 P₂O₅ + 80-100 K₂O + 5-10 tấn phân chuồng. Tương đương với Urê 300-400 kg + Super lân 500-650 kg + KCl 150-170 kg.

Loại phân/ Lần bón	P. chuồng (tấn)	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	Thời kỳ bón
Bón lót	5-10	1/4	Toàn bộ		Chuẩn bị đất
Thúc lần 1		1/4		1/2	Khi cây 3-5 lá (10-15 NSG)
Thúc lần 2		1/2		1/2	Khi cây 9-10 lá (30-40 NSG)

Cần bón đúng thời gian khuyến cáo, không nên bón trực tiếp vào gốc mà rải đều cách gốc tối thiểu 10 cm. Khi bón thúc nên kết hợp làm cỏ và vun gốc.

CHĂM SÓC

Cần dặm tỉa cây để đảm bảo mật độ, nên dặm sớm vào giai đoạn 5-7 ngày sau gieo. Tưới nước đủ ẩm, tránh úng hoặc khô hạn, nhất là giai đoạn trổ cờ phun râu. Diệt cỏ bằng thuốc Maizine 80WP phun vào giai đoạn mới gieo (tiền nảy mầm) và khi cỏ cao 2-3 cm (hậu nảy mầm). Ở giai đoạn 8-12 và 30-35 ngày sau gieo nên phun thêm phân bón lá hữu cơ Supermes để tăng khả năng sinh trưởng và năng suất.

PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH

Phòng trừ sâu đục thân, đục trái bằng cách rải Regent, Furadan, Basudin hạt vào lá nõn vào giai đoạn 32 và 42 ngày sau gieo, chú ý khi bỏ Furadan và Basudin nên bỏ lượng vừa phải nếu nhiều sẽ làm cháy lá nõn. Ngừa bệnh khô vằn, cháy lá bằng thuốc Anvil, Tilt Supper hoặc Amidstartop.

THU HOẠCH

Khi vỏ bì vàng, chân hạt có vết đen là thu hoạch được.



Tập Đoàn Giống Cây Trồng Việt Nam - 50 năm đồng hành cùng nông nghiệp Việt

🏠 Số 1 Lương Định Của, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội

☎ 024 3852 3294

📠 024 3852 7996

✉ nsc@vinaseed.com.vn

🌐 www.vinaseed.com.vn