

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2020

## KỸ THUẬT TRỒNG NGÔ LAI ĐƠN SSC557

### ĐẶC TÍNH

Giống ngô SSC557 thuộc nhóm giống trung ngày, cây con sinh trưởng mạnh, rễ chân kiềng phát triển nên có khả năng chống chịu đổ ngã tốt, thân đanh gọn có thể trồng mật độ dày. Trái đồng đều, hạt đóng múp đầu trái. Hạt màu vàng cam đẹp, dạng hạt đá. Chống chịu khá tốt với các loại bệnh gây hại chính như gỉ sắt, cháy lá lớn và cháy lá nhỏ. Thời gian sinh trưởng 90-105 ngày (tùy vụ). Hạt to, sâu cay nên tỷ lệ hạt/trái cao. Năng suất cao, ổn định, năng suất 9-12 tấn/ha.

### THỜI VỤ

Tính thích nghi rộng, trồng được 3 vụ trong năm và trên nhiều loại đất khác nhau. Tùy điều kiện sinh thái mà bố trí thời vụ sao cho giai đoạn trổ cờ phun râu nhiệt độ ( $15^{\circ}\text{C} < T < 35^{\circ}\text{C}$ ) để bấp đậu hạt tốt. Cụ thể thời điểm nhạy cảm là miền Nam tháng 3, 4; miền Bắc cuối tháng 12 đến tháng 1 dương lịch.

### MẬT ĐỘ

SSC557 NEW thích hợp trồng dày, mật độ thích hợp cho năng suất cao nhất là 80.000-85.000 cây/ha, tương đương với khoảng cách là (60-65) x (18-20) cm. Riêng vụ Đông Xuân có thể trồng 90.000 cây/ha, tương đương với khoảng cách là 60x18 cm. Lượng giống cần cho 1 ha khoảng 17-20 kg.

### PHÂN BÓN

Là giống lai trung ngày nên cần bón phân cân đối, tập trung và kịp thời. Nếu đầu tư càng cao thì năng suất càng tăng. Lượng phân và cách bón khuyến cáo cho 1ha như sau: DAP (150-200 kg) + Urê (200-300 kg) + KCl (100-150 kg).

Cách bón	Lượng phân
Bón lót (trước khi gieo hạt)	Toàn bộ DAP
Thúc lần 1 (6-7 lá) (15-20 ngày sau gieo)	1/2 Ure + 1/2 KCl
Thúc lần 2 (9-10 lá) (35-45 ngày sau gieo)	1/2 Ure + 1/2 KCl

Bón phân kết hợp làm cỏ và vun gốc khi bón thúc cho cây.

### CHĂM SÓC

Tưới nước đủ ẩm, tránh úng hoặc khô hạn, nhất là giai đoạn trổ cờ phun râu. Diệt cỏ bằng thuốc Maizine 80WP phun vào giai đoạn mới gieo (tiền nảy mầm) và khi cỏ cao 2-3 cm (hậu nảy mầm). Ở giai đoạn 8-12 và 30-35 ngày sau gieo nên phun thêm phân bón lá hữu cơ Supermes để tăng khả năng sinh trưởng và năng suất.

### PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH

Phòng trừ sâu đục thân, đục trái bằng cách rải Regent, Furadan, Basudin hạt vào lá nõn vào giai đoạn 32 và 42 ngày sau gieo, chú ý khi bỏ Furadan và Basudin với lượng vừa phải nếu nhiều sẽ làm cháy lá nõn. Ngừa, trị bệnh khô vằn bằng thuốc Anvil, Validacin, Tilt Supper...

### THU HOẠCH

Khi vỏ bì vàng, chân hạt có vết đen là thu hoạch được.