

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2020

## KỸ THUẬT TRỒNG NGÔ LAI ĐƠN SSC586

### I.ĐẶC TÍNH

Giống bắp SSC586 thuộc nhóm giống trung ngày, cây con sinh trưởng mạnh, đồng đều, thân lá to, bộ lá xanh bền đến khi thu hoạch. Bắp to, đều, kết hạt tốt. Hạt to, màu vàng cam, dạng hạt nửa đá, tỷ lệ hạt/bắp 77-79%. SSC586 chống chịu khá tốt với các loại bệnh cháy lá, gỉ sắt. Thời gian sinh trưởng biến động từ 95-120 ngày (tùy vùng). Tiềm năng năng suất 8-10 tấn/ha. Đặc biệt SSC586 có thân lá to phù hợp cho phát triển sinh khối (sử dụng làm thức ăn chăn nuôi).

### II.THỜI VỤ

Có thể trồng được 3 vụ trong năm và trên nhiều loại đất khác nhau. Tùy điều kiện sinh thái mà bố trí thời vụ sao cho giai đoạn trở cờ phun râu nhiệt độ ( $15\text{ }^{\circ}\text{C} < t < 35\text{ }^{\circ}\text{C}$ ) để bắp đậu hạt tốt. Cụ thể thời điểm nhạy cảm là miền Nam tháng 2,3; miền Bắc cuối tháng 12 đến đầu tháng 1 dương lịch.

### III.MẬT ĐỘ

SSC586 là giống chịu thâm canh, không thích hợp trồng quá dày, mật độ thích hợp cho năng suất cao nhất là 67000-77000 cây/ha, tương đương với khoảng cách là 75 x 20 cm hoặc 65 x 20 cm. Lượng giống cần cho 1ha khoảng 14 – 18 kg.

### IV.PHÂN BÓN

Phân nguyên chất: 150-180 N + 80-100 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> + 80-100 K<sub>2</sub>O + 5-10 tấn phân chuồng. Tương đương với Urea 300-400kg + Super lân 500-650kg + KCl 150-170kg.

LOẠI PHÂN	P.Chuồng (tấn)	N	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	K <sub>2</sub> O	THỜI KỲ BÓN
Lần bón					
Bón lót	5 – 10	1/4	Toàn bộ		Chuẩn bị đất
Thức lần 1		1/4		½	Khi cây 3-5 lá (10-15NSG)
Thức lần 2		1/2		½	Khi cây 9-10 lá (30-40NSG)

Cần bón đúng thời gian khuyến cáo, không nên bón trực tiếp vào góc mà rải đều cách gốc tối thiểu 10cm. Khi bón thức nên kết hợp làm cỏ và vun gốc.

### V.CHĂM SÓC

Cần dặm tía cây để đảm bảo mật độ, nên dặm sớm vào giai đoạn 5 -7 ngày sau gieo. Tưới nước đủ ẩm, tránh úng hoặc khô hạn, nhất là giai đoạn trở cờ phun râu. Diệt cỏ bằng thuốc Maizine 80WP phun vào giai đoạn mới gieo (tiền nảy mầm) và khi cỏ cao 2 – 3cm (hậu nảy mầm).

### VI.PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH

Phòng trừ sâu đục thân, đục trái bằng cách rải Regent, Furadan hạt vào lá nõn vào giai đoạn 32 và 42 ngày sau gieo, chú ý khi bỏ Furadan và Basudin nên bỏ lượng vừa phải nếu nhiều sẽ làm cháy lá nõn. Ngừa bệnh khô vằn, cháy lá bằng thuốc Anvil, Tilt Supper hoặc Amidstartop.

### VII. THU HOẠCH

Khi vỏ bì vàng, chân hạt có vết đen là thu hoạch được.