

## HƯỚNG DẪN GIEO TRỒNG GIỐNG NGÔ NGÂN ĐIỆP 926

**I. Nguồn gốc:** Là giống lai F1, do Vinaseed nghiên cứu và tuyển chọn.

### II. Đặc tính giống:

Là giống chín trung bình sớm, thời gian gieo trồng: Vụ Xuân 85-90 ngày; vụ Hè Thu 65-70 ngày; vụ Thu Đông 70-75 ngày, vụ Đông 75-85 ngày. Phổ thích nghi rộng.

Chiều cao cây 165-180 cm, chiều cao đóng bắp 80-95cm, chông đồ khá. Bắp dài 16 -18 cm, đường kính 4,5- 5,5 cm, bắp đậu kín hạt, lá bi xanh và rất kín. Hàng hạt thẳng, mịn, hạt to và sâu cay. Số hàng hạt/bắp 14 -16 hàng, số hạt/hàng 30-40 hạt. Tiềm năng năng suất bắp tươi 18-20 tấn/ha. Bộ lá thoáng, xanh đậm, bền đến khi thu hoạch; chất lượng thơm ngon, vị ngọt sắc do trên bắp có khoảng 25-30% hạt ngô đường trắng xen kẽ.

### III. Yêu cầu kỹ thuật:

**1. Thời vụ:** Có thể trồng quanh năm trên đất tưới tiêu chủ động. Tuy nhiên, cần bố trí thời vụ tránh cây trở cờ phun râu vào thời điểm nắng nóng kéo dài trên 35<sup>0</sup>c hoặc lạnh dưới 15<sup>0</sup>c để đảm bảo năng suất. Vụ Xuân: thời gian gieo trồng xoay quanh tiết lập xuân từ 20/1 - 25/2, vụ Hè Thu: từ 15/6 - 15/7, vụ Thu Đông: từ 15/8 - 15/9, vụ Đông: từ 15/9 - 15/10. Yêu cầu trồng cách ly thời gian (tối thiểu 15 ngày) và không gian (có vật cản hoặc khoảng cách tối thiểu 300m) với các giống ngô tẻ, ngô đường vàng để đảm bảo chất lượng và màu sắc hạt.

**2. Mật độ, khoảng cách:** Mật độ trồng: 4,7 - 5,1 vạn cây/ha (lượng giống 15 - 17kg/ha). Khoảng cách: 65 cm x 30-33 cm.

**3. Phân bón:** Nên sử dụng phân bón tổng hợp NPK thay thế phân đơn:

#### 3.1. Đối với phân NPK Lâm Thao (cho 1ha):

Bón lót: 8 - 10 tấn phân hữu cơ (hoặc 2 tấn phân vi sinh) + 700kg NPK (5:10:3). Tưới dặm (ngô 2-3 lá): tưới hoặc bón 60kg Urê. Bón thúc lần 1 (ngô 4-5 lá): 250kg NPK (12:5:10). Bón thúc lần 2 (ngô 8-9 lá): 250kg NPK (12:5:10).

*Lưu ý: Nếu sử dụng phân tổng hợp NPK khác, bón theo hướng dẫn trên bao bì của nhà sản xuất.*

#### 3.2. Đối với phân đơn (cho 1ha):

Bón lót: 8 - 10 tấn phân hữu cơ (hoặc 2 tấn phân vi sinh) và 420 - 470kg phân lân (70-80kg P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) (có thể ngâm lân với nước phân để tưới cho cây con)+ 65-75kg đạm Urê (30-35kg N). Bón thúc lần 1 (ngô 4 - 5 lá): 65-75kg đạm Urê (30-35kg N) + 60-75kg Kaliolorua (35-45kg K<sub>2</sub>O). Bón thúc lần 2 (ngô 8- 9 lá): 130 - 150kg đạm Urê (60-70 kg N) + 60-75kg Kaliolorua (35-45kg K<sub>2</sub>O).

#### 4. Chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh:

Chăm sóc: Xới xáo, dặm tĩa ngay sau khi mọc để đảm bảo mật độ. Bón thúc lần 1 kết hợp làm sạch cỏ dại và vun nhẹ quanh gốc. Bón thúc lần 2 kết hợp làm sạch cỏ dại và vun cao chống đổ. Có thể dùng thuốc trừ cỏ chọn lọc: Atamex 800WP, Mizin 80WP,... phun khi cỏ chưa mọc hoặc cỏ còn non (2-3 lá).

*Lưu ý: Trước khi phun mật ruộng phải đủ ẩm, sau khi phun nếu gặp mưa không được để ruộng đọng nước.*

Tưới tiêu: Đảm bảo đủ độ ẩm đất trong suốt quá trình sinh trưởng và phát triển, đặc biệt chú ý vào các thời kỳ ngô 5-7 lá, xoắn nõn, trở cờ, chín sữa. Lưu ý: Sau khi tưới nước hoặc sau mưa phải thoát hết nước đọng trong ruộng ngô.

Phòng trừ sâu bệnh hại: Thường xuyên theo dõi tình hình sâu bệnh hại trên đồng ruộng để phòng trừ kịp thời. Sử dụng thuốc hoá học theo hướng dẫn của ngành bảo vệ thực vật hoặc hướng dẫn trên bao bì của nhà sản xuất.

**5. Thu hoạch:** Thu hoạch ăn tươi sau phun râu 20 - 22 ngày. Thu hoạch hạt khô khi ngô đã chín (lá bi khô, chân hạt đen), chọn ngày có thời tiết khô ráo để thu hoạch.